

ICS 65. 020. 30

CCS B 43

DB36

江西省地方标准

DB36/T 2110—2024

鄱阳湖水牛种牛生产技术规范

Technical regulations for production of Poyang Lake breeding Buffalo

地方标准信息服务平台

2024 - 12 - 30 发布

2025 - 07 - 01 实施

江西省市场监督管理局

发布

目 次

目 次 I

前 言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 牛场选址和牛舍建造 1

5 种牛选择 1

6 饲养管理 2

7 卫生管理与疫病防治 2

8 档案管理 2

地方标准信息服务平台

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江西省农业农村厅提出。

本文件由江西省畜牧业标准化技术委员会（JX/TC 010）归口。

本文件起草单位：九江市农业科学院、江西农业大学、庐山市农业农村局、永修县农业农村局。

本文件主要起草人：柯尝玲、刘敬、徐仕明、曾思静、黄玲、邱清华、赵向辉、李艳娇、欧阳克蕙、丁超、况金云、曹奎、黄平、欧阳晓星、樊建新、汪娟、高茂应、王兴明、雷明亮、吕龙东。

地方标准信息服务平台

鄱阳湖水牛种牛生产技术规程

1 范围

本文件规定了鄱阳湖水牛种牛的牛场选址和牛舍建造、种牛选择、饲养管理、卫生管理与疫病防治和档案管理。

本文件适用于鄱阳湖水牛种牛的饲养管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- NY/T 1339 肉牛育肥良好管理规范
- NY/T 1446 种公牛饲养管理技术规程
- NY/T 2967 种牛场建设标准
- NY/T 3467 牛羊饲养场兽医卫生规范
- DB36/T 2047 鄱阳湖水牛

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

鄱阳湖水牛 Poyang Lake Bufflao

役肉兼用型水牛地方品种，因主要生长于鄱阳湖及周边滨湖地区而得名，其主产区位于江西省北部鄱阳湖周围的永修、星子、都昌、鄱阳、余干、进贤、南昌等县市。体型高大，骨骼粗壮。全身被毛稀疏，多为灰色或棕红色，颈下有一条或两条月牙形白带，多有白袜子。耐热、耐寒、体质结实。

4 牛场选址和牛舍建造

4.1 牛场选址

牛场选址应符合NY/T 2967的要求。

4.2 牛舍建造

牛舍建造应符合NY/T 2967的要求。距牛舍30.0 m~50.0 m处应建造水塘。

5 种牛选择

选种按照DB36/T 2047的要求进行。运输和隔离按照NY/T 1339的要求进行。

6 饲养管理

6.1 犊牛

出生2h内饲喂初乳，如果母牛无初乳或乳量少，要用人工乳替代。应在栏内和运动场中提供干净温水，供其自由饮用。犊牛4~6月龄断奶。

6.2 后备牛

日粮以粗饲料为主，视母牛体况，适当补充精料。

6.3 种牛

6.3.1 种公牛

种公牛饲养管理可以参考NY/T 1446的要求。饲喂的草、料要充足，搭配合理，能满足种公牛的生长发育和生产需要。配种任务较重时，应补充优质的蛋白质饲料。

6.3.2 种母牛

6.3.2.1 妊娠期

不同妊娠阶段饲养管理如下：

a) 妊娠初期（前3个月）：按常规饲养，视母牛体况，适当补充精料。

b) 妊娠中期（4~8个月）：此阶段应充分饲喂青粗饲料，适当减少精料，适当补充钙、磷。

c) 妊娠后期（9个月至分娩）：增加营养物质含量，保证胎儿发育营养需要。产前15d左右视母牛的膘情调整日粮饲料喂量，保持中等膘情为宜。

6.3.2.2 哺乳期

母牛分娩当天，立即饮喂温热的麸皮盐糖水（食盐150 g、红糖1 kg、麸皮2 kg，加8 kg~10 kg开水冲调，降温到40℃~45℃），同时喂给优质易消化的青粗饲料。产后2d~7d，应饲喂适口性好易消化的青饲料、干草，适当添加优质精饲料。之后视母牛体况和产奶量，逐步增加精料，提供充足的蛋白质、无机盐和维生素。母牛要适当的运动，增强体质。定期修蹄，减少蹄病。

7 卫生管理与疫病防治

7.1 卫生管理

按照NY/T 3467的要求执行。

7.2 疫病防治

按照NY/T 1339要求执行。

8 档案管理

按照NY/T 1339要求执行。

地方标准信息服务平台