

DB 63

青 海 省 地 方 标 准

DB 63/T 2561—2026

八眉猪饲养管理技术规范

2026 - 05 - 07 发布

2026 - 06 - 01 实施

青海省市场监督管理局 发 布

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由青海省农牧业标准化技术委员会提出。

本文件由青海省农业农村厅归口。

本文件起草单位：青海省畜牧总站、青海省饲草料技术推广站、互助县八眉猪养殖技术服务中心、尖扎县畜牧兽医站。

本文件主要起草人：方永嵘、韩明清、陈永伟、付弘赟、薛长安、马艳圆、安梨红、张积英、姚国良、马正麒、张德莹、米长寿、张莲芳、卫世腾、韩生财、宋啟珠、许威、张亚君、史鸿宣、黄世斌、许发芳、刘天梅、史岳兰、王小哲、马云。

本文件由青海省农业农村厅监督实施。

八眉猪饲养管理技术规范

1 范围

本文件规定了八眉猪饲养管理技术的后备猪饲养管理、繁殖母猪饲养管理、种公猪饲养管理、哺乳仔猪饲养管理、生长育肥猪饲养管理、日粮配制、疫病防治、档案记录与管理要求。

本文件适用于八眉猪的饲养管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5749 生活饮用水卫生标准
GB 13078 饲料卫生标准
GB 23238 种猪常温精液
GB/T 17823 集约化猪场防疫基本要求
GB/T 25172 猪常温精液生产与保存技术规范
GB/T 39235 猪营养需要量
NY/T 636 猪人工授精技术规程
NY/T 3445 畜禽养殖场档案规范

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 后备猪饲养管理

4.1 后备母猪

- 4.1.1 后备母猪每栏饲养 4~6 头，每头面积 $\geq 2 \text{ m}^2$ 。
- 4.1.2 4 月龄前自由采食，此后限量饲喂，不宜过肥或过瘦，饮水符合 GB 5749 规定。
- 4.1.3 定期消毒猪舍，及时清理粪(尿)，保持猪舍通风换气。
- 4.1.4 年龄达到 5~6 月龄，体重达到 60 kg 以上，且发情 2 次后可初配。

4.2 后备公猪

- 4.2.1 断奶后至 3 月龄群养，8~10 头/栏，每头面积 $\geq 0.3 \text{ m}^2$ ；3 月龄后 1 头/栏，每头面积 $\geq 4 \text{ m}^2$ 。
- 4.2.2 体重 $< 50 \text{ kg}$ 自由采食；体重 $\geq 50 \text{ kg}$ 限量饲喂，保持中等体况，饮水符合 GB 5749 规定。
- 4.2.3 4~5 月龄开始调教采精，每周 4~5 次，每次调教 20 min 为宜，在进食 1 h 后进行。初次调教成功后，每隔 2 d~3 d 重复调教。公猪 6 月龄、体重达 60 kg 开始配种。使用前应进行精液品质检查，精液品质符合 GB 23238 规定。
- 4.2.4 保持猪舍通风换气，食槽、躺卧区干燥卫生；定期消毒地面、用具、食槽等；夏季应防暑降温，温度 $\leq 28^\circ\text{C}$ ；冬季应防寒保暖，温度 $\geq 15^\circ\text{C}$ 。

5 繁殖母猪饲养管理

5.1 空怀母猪

5.1.1 日粮饲喂

每头日饲喂全价饲料1.5 kg~2.5 kg, 保持中等体况。

5.1.2 发情鉴定

采用优饲催情、母猪合群和公猪诱情等方式促进母猪发情, 并用发情征状鉴别和试情法进行鉴定。母猪发情持续期为3 d~7 d, 发情盛期集中在发情开始后的第2 d~3 d。

- a) 发情前期, 表现出爬跨其它母猪, 外阴部膨大, 阴道粘膜呈浅红色, 有少量稀薄透明粘液, 但不接受公猪爬跨;
- b) 发情中期, 压背时静立不动, 外阴部肿大, 颜色呈深红色, 阴道黏膜湿润, 流出的黏液量增多, 质地黏稠、呈牵丝状;
- c) 发情后期, 趋于稳定, 外阴部开始收缩, 阴道粘膜呈淡红色, 粘液浓稠, 不愿接受公猪爬跨。

5.1.3 配种或输精

母猪发情后8 h~12 h内进行第一次配种或输精, 之后每间隔8 h~12 h内进行第二次或第三次配种或输精。人工授精操作按照NY/T 636 执行。

5.2 妊娠母猪

5.2.1 妊娠诊断

5.2.1.1 外部观察法。当母猪配种后同时出现以下现象可判定受孕: 表现疲倦、贪睡、贪食, 性情安静, 行动稳重, 皮毛日渐光泽, 体重日增, 逐渐上膘; 外阴部收缩; 在配种后 17 d~24 d 和 38 d~45 d 两个时间段利用公猪进行返情检查, 不再有发情表现。

5.2.1.2 B超诊断法。配种后 22 d~28 d、35 d~45 d 用 B 超进行两次检测。

5.2.2 日粮饲喂

- a) 妊娠前期(21 d 前), 每头日饲喂全价饲料 1.5 kg~2.0 kg;
- b) 妊娠中期(22 d~80 d), 每头日饲喂全价饲料 2.0 kg~2.2 kg;
- c) 妊娠后期(81 d 后), 每头日饲喂全价饲料 2.2 kg~2.5 kg。

5.2.3 管理

妊娠后母猪从配种舍转到妊娠舍、产前1周转到产仔舍。妊娠过程中应减少对母猪的不良刺激。

5.3 哺乳母猪

5.3.1 分娩与助产

母猪出现临产症状, 做好接产准备; 分娩的持续时间为 0.5 h~6 h, 产仔间隔为 15 min~20 min, 超时助产。

5.3.2 日粮饲喂

母猪分娩当天可不喂料, 分娩后前3 d每头日饲喂全价饲料1.5 kg~2.0 kg, 3 d后自由采食, 断奶前3 d开始减料, 断奶当天可不喂。

5.3.3 管理

5.3.3.1 产房保持清洁、干燥、安静, 温度控制在 20℃~23℃, 湿度控制在 50%~70%。

5.3.3.2 产仔结束后, 应及时对母猪外阴部进行清洗消毒, 预防感染, 观察胎衣以及恶露的排出情况, 对胎衣未排完、恶露较多的母猪及时清宫。

6 种公猪饲养管理

6.1 饲养

- 6.1.1 单栏饲养，圈舍清洁卫生、通风良好、光照充足，圈舍适宜温度为18℃~20℃。
- 6.1.2 饲料日粮营养全面，营养需要量符合GB/T 39235 规定；按每头每日2.0 kg~2.5 kg 喂料，维持种用体况；利用强度高时，补充优质蛋白饲料。
- 6.1.3 定时饲喂和采精，公猪配种或采精宜在饲喂1 h 后进行。
- 6.2 精液采集
按照GB/T 25172 执行。
- 6.3 利用强度
本交时，成年公猪每周配种3~4次，青年公猪每周1~2次；采精时，成年公猪每周采精2~3次，青年公猪每周采精1~2次，不应连续使用。
- 6.4 淘汰
种公猪利用年限为5~6年。有下列情况之一的，应予淘汰：
a) 因病、因伤不能使用的；
b) 精液品质符合GB 23238 规定，连续两次以上精液品质检查不合格的；
c) 性情暴烈易伤人、伤猪的；
d) 繁殖力低下的。

7 哺乳仔猪饲养管理

- 7.1 吃初乳
出生后及时吃足初乳，2 d内应进行人工辅助固定乳头，弱小仔猪放在前边乳头、体大强壮仔猪放在后边乳头。
- 7.2 保温防压
环境温度控制在30℃~35℃，相对湿度60%~70%，配置有保暖设备的保育箱，使用设护栏的分娩栏。
- 7.3 寄养
母猪产仔过多或无力哺乳仔猪，应将多余仔猪寄养给迟1 d~2 d分娩的母猪。
- 7.4 开食补水
仔猪7日龄开食，采取自由采食和诱食相结合的方法，饮水符合GB 5749 规定。
- 7.5 去势与断奶
仔猪出生后14日龄去势，35~42日龄、体重达到5.5 kg以上断奶。

8 生长育肥猪饲养管理

- 8.1 保育猪
- 8.1.1 日粮饲喂
自由采食饮水，饮水符合GB 5749 规定。
- 8.1.2 管理
- 8.1.2.1 按窝转群时，每栏饲养1~2窝仔猪；不按窝转群时，将同一天断奶的仔猪，按体重、性别和强弱分群。
- 8.1.2.2 保持饲料、饲槽和圈舍卫生；舍内温度控制在25℃~30℃，相对湿度50%~70%，保持空气新鲜。
- 8.2 育肥猪
- 8.2.1 日粮饲喂
自由采食饮水，饮水符合GB 5749 规定。

8.2.2 管理

8.2.2.1 根据性别、体重、体况等进行分群饲养。

8.2.2.2 注意猪舍通风，舍内温度控制在 20℃～25℃，相对湿度 50%～70%，定期消毒地面、用具、食槽等，食槽、躺卧区干燥卫生。

8.2.2.3 观察猪只采食、精神状态、皮毛色泽等，发现异常及时隔离或淘汰。

9 日粮配制

饲料卫生符合GB 13078 规定；日粮营养需要符合GB/T 39235 规定。

10 疫病防治

按照GB/T 17823 执行。

11 档案记录与管理

按照 NY/T 3445 执行。
